

頭部撞擊

若頭部遭受到撞擊，而患者仍有意識，且抱怨：

- ◇ 暈眩
- ◇ 耳鳴
- ◇ 頭痛
- ◇ 反胃
- ◇ 視覺模糊

你發現下面任一狀況：

- ◇ 從鼻或耳中流出血液或透明液體
- ◇ 頭蓋骨隆起或變形
- ◇ 流血
- ◇ 兩邊瞳孔大小不一(以筆燈檢查)
- ◇ 抽搐、痙攣
- ◇ 口齒不清
- ◇ 喪失記憶
- ◇ 眼睛無法隨指示轉動

◎注意是否有上/ 下肢的無力或癱瘓以檢查可能發生的頸部/ 脊椎的傷害。若捏其手或腳而沒什麼反應，立即依發現 傷害當時的姿勢來固定其頭頸部以避免任何移動，並要求患者不要動。

◎以乾燥的消毒紗布直接輕壓傷口止血。若懷疑有顱骨骨折，則輕壓傷口周圍，勿直接壓迫傷口。

◎可以冰袋冰敷 20 分鐘以協助止血或減輕疼痛。

◎不要阻礙任何耳中流出的液體。(可能是腦脊髓液或血液)

◎若無脊椎傷害之疑慮，可以托高患者的上半身，但在托起時，勿折頸部以免造成呼吸道之阻塞。切勿抬高雙腿，因這會增加腦壓(血液回流)。

◎勿給食物或飲料、立即送醫。

若患者頭部受到撞擊後不省人事，且可能出現：

- ◇ 呼吸困難
- ◇ 從鼻或耳中流出血液或透明液體
- ◇ 應當作有頭/ 頸部傷害來處理
- ◇ 檢查 ABC (呼吸道、呼吸、循環)，用托顎法暢通呼吸道，勿扭曲頸部。依發現當時的姿勢來固定頭頸部。
- ◇ 以乾燥的消毒紗布直接輕壓傷口止血。若懷疑有顱骨骨折，則輕壓傷口周

圍。

- ✧ 可以冰袋冰敷 20 分鐘以協助止血或減輕疼痛。
- ✧ 若已排除頭/ 頸部傷害的可能性，可以讓患者維持復甦姿勢。
- ✧ 立即尋求醫療協助。

若有下列情形：

- ✧ 受傷部位疼痛
- ✧ 頭顱變形（凹陷或凸起）
- ✧ 自耳或鼻中流出血液
- ✧ 自耳或鼻中流出透明液體
- ✧ 眼皮下變色（黑眼圈）
- ✧ 耳後有瘀青
- ✧ 瞳孔大小不一
- ✧ 頭皮大量出血
- ✧ 反胃、昏眩



◎視同患者有頭部外傷或腦震盪，馬上開始急救。

◎立即尋求醫療協助